



900 ปี
การสาธารณสุขไทย

សាខាបែងចុះអនុវត្តន៍

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561



นโยบายอาหารปลอดภัย



สร. หารือกับ ก.เกษตรฯ เกี่ยวกับแนวการการบูรณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์เพื่อคุ้มครองพืชบริโภคด้านความปลอดภัยอาหาร โดยมีข้อสรุปความร่วมมือ ดังนี้ 1.ตั้งคอกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่าง สร. ก.เกษตรฯ และ ก.มหาดไทย 2.สนับสนุนการ "ปลูก ขาย ใช้" โดยให้รพ.ปลูกพักปลอดสารพิษ จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายพืชพักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งนำมาระกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำหน่ายในรพ. 3.สร.จะร่วมเก็บรวบรวมพักรุกรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของ ก.เกษตรฯ



ជំរួយអេឡិចកុមិនុព្យូទ័រតិចភាគខ្លួន

สร. ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการช่วยเหลือกิมนาคนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำ โดยจัดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของกิมแพกย์กูชิพ พร้อมอุปกรณ์การแพกย์ เพื่อให้การดูแลเบื้องต้นที่บริเวณปากถ้ำและทางปล่อง และจัดเตรียมรถพยาบาลขึ้นสูงครบทั่วบ้านคุน รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับส่งต่อพ.เชียงราย ประชาชนใน kra นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมพ.รอดจุดเกิดเหตุ ทั้งพ.แม่สาย และพ.แม่จัน รองรับการส่งต่อ จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น เชื่อว่าถ้า 13 คนน่าจะอ่อนแรง เผรำขาดอาหารและน้ำ เกลือแร่ ในร่างกายไม่สมดุล ส่วนการไม่ได้เจอแสง แฉดมาหลายวันต้องปิดดวงตาเพื่อให้ปรับสภาพ สำหรับเรื่องสภาพจิตใจญาติ ขณะนี้ได้รับการดูแลจากกิมแพกย์พ.สุวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กฯ และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ปกครอง 2-3 คนที่ยังคงมีความเครียดมาก ส่วนผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำ กิมนาคนักจิตวิทยาได้จัดทำข้อมูลของแต่ละคนเพื่อวางแผนในการติดตามดูแลในระยะยาวจนกว่าจิตใจจะกลับสุกภาวะปกติ



ໂຄມະເຮັງເຕັນມ

กระบวนการแพทย์ เพย์ มะเร็งเต้านมในสตรีไทย มีอุบัติการณ์เกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้หญิงอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปเสี่ยงมากขึ้น แนะนำให้มีสังเกตความพิดปกติด้วยตนเอง และตรวจเต้านมเป็นประจำหรือตรวจเบบโน้แกรเมเนื้อวัย 40 ปีขึ้นไป โดยตรวจเต้านมด้วยตนเองหน้ากระจก 3 ท่าคือ 1.ยืนตรง แขนชิดลำตัว ดูประชัยเกียบเต้านม 2 ข้าง และหันตัวเล็กน้อยเพื่อสังเกตด้านข้าง 2.ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นเหนือศีรษะร่วมกับขยับแขนขึ้นลง สังเกตรอยบุ๋มที่พิวหนัง 3.เอียงตัวไปทางหน้า ยกกระลามเนื้อหน้าอกเกริ่งตัวโน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อสังเกตรอยดึงรั้ง นอกจากนี้ ให้คลำที่เต้านม 3 แบบ 1.คลำเป็นก้อนหอยหรือตามเข็มนาฬิกา 2.คลำตามแนวโนนขึ้นลงบนกับลำตัว 3.คลำเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือรูปกลีบ และบีบบริเวณหัวนม และลากหัวนมเบาๆ หากพบความพิดปกติ ควรรับพบแพทย์



ว่าบข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/irpg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”