



900 ปี
การสาธารณสุขไทย

น่าเด่น สธ.

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561



เตรียมพร้อมรับอุทกภัย

ปลัด สธ. สั่งการศูนย์ EOC ส่วนกลาง ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตลอด 24 ชม. พร้อมแจ้งเตือน รพ. ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดำเนินการ 1. ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางไฟ ไปไว้ใน กีบปลอดภัย 2. ป้องกันน้ำท่วม รพ. โดยกันกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3. สำรวจและสำรองยา เวชภัณฑ์ ออกจากเจ็บ ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งยาช่วยชุดน้ำท่วม 4. สำรวจผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หลังตั้งครรภ์ พุ่งวัยในพื้นที่ กำแพงห้องน้ำ 5. เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมออกให้บริการประชาชนทันที และเตรียมสถานที่ให้บริการประชาชน หากน้ำท่วมมากเข้า-ออก รพ.

สำหรับ จ. เพชรบุรี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ สสจ. เพชรบุรี และ รพ. พระจอมเกล้าฯ และให้แต่ละอำเภอสำรวจ เวชภัณฑ์ยา จำนวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หลังตั้งครรภ์ พุ่งวัยในพื้นที่ พร้อมประสานขอรับการสนับสนุน รถบัสเคลื่อน 4 ล้อยกสูง เวชภัณฑ์ยาสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย 20,000 ชุด จากส่วนกลาง หากต้องการ ความช่วยเหลือสนับสนุนสามารถผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทันที ด้านกรมสุขภาพจิต ให้ รพ. จิตเวช ในสังกัด 20 แห่งทั่วประเทศเตรียมทัน MCATT พร้อมยาและเวชภัณฑ์ทางจิตเวช พร้อมสนับสนุนเครือข่ายทุกอำเภอ ดูแลประชาชนและผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย



โรคเมืองท้าวปาก

สำนักงานสาธารณสุข รายงานตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ก.ค. 61 พบผู้ป่วยโรคเมืองท้าวปาก 33,199 คน วัตรายปีสูงสุด คือ ภาคกลาง รองลงมา ภาคเหนือ ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 98 เป็นเด็กเล็กในปีครองและนักเรียน ในจำนวนนี้ เกือบร้อยละ 68 เป็นเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ขอให้คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน หากพบมีไข้ มีตุ่มแดงภายในช่องปาก ฟันเสื่อม ฟันหัก ให้เด็กหยุดเรียน จนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ



อวฟฟิศชันโดรน

กรมการแพทย์ เพย กลุ่มอาการอวฟฟิศชันโดรนมักเกิดกับผู้ที่ต้องนั่งทำงานในอวฟฟิศกันวัน ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ และมีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอาการ กล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามวัยวะต่างๆ ปวดหลังเรื้อรัง จากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ สะบัก เมื่อยเกร็งอยู่ตลอดเวลา กระบังลมขยายได้ไม่เต็มที่ สมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ ทำให้ ง่วงนอน หากเครียดจะทำให้โรคrunแรงขึ้น อาจถึงขั้นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท การรักษาเพียงปรับเปลี่ยนอิริยาบถ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้น อาจให้ยาบรรเทาอาการหรือต้องผ่าตัด



อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”