



900 ปี  
การสาธารณสุขไทย

# ข่าวเด่น สร.

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

**M**

**Mastery**

เป็นนายตนเอง

**O**

**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่

**P**

**People Centered**

ใส่ใจประชาชน

**H**

**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

## ความร่วมมือด้านสุขภาพ ไทย-ภูฏาน

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายเลียมโป่ กันดิน วังชุก รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขภูฏาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขในสาขาเดิมที่ร่วมมือกันมานานเกือบ 30 ปี และขยายความร่วมมือใหม่ 11 สาขา อาทิ การป้องกันโรคติดต่อ การตรวจผลการห้องปฏิบัติการ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุข โดยจะให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรภูฏานในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ ม.มหิดล อย่างละ 1 ทุน รวมถึงความร่วมมือในการส่งผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนมารักษาต่อที่ประเทศไทย และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรคไต และโรคทางเดินอาหาร



## บุหรี่ไฟฟ้า

กรมควบคุมโรค เหยียดข้อมูลการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก อายุ 13-15 ปี ในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า มีเยาวชนใช้หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้า ร้อยละ 3.3 และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือสำหรับช่วยเลิกบุหรี่ และมีอันตรายทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ใกล้เคียง โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ เด็ก และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะส่วนมากมีสารนิโคติน ทำให้เยาวชนเสพติดได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมอง ทำลายสมาธิและการเรียนรู้ และ จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศ พบบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินทำให้ก่อมะเร็งปอด กระแทบหัวใจ และหลอดเลือด และควันจากบุหรี่ไฟฟ้าก่อฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หากประชาชนต้องการเลิกสูบบุหรี่ปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600 หรือ คลินิกเลิกบุหรี่ใน รพ. สังกัด สร.



## โรคไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค เหยียดสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วย 3,072 ราย เสียชีวิต 9 ราย เป็นเด็กโตอายุ 10-24 ปี 6 ราย ผู้สูงอายุ 2 ราย วัยทำงาน 1 ราย ส่วนมากมีโรคประจำตัวร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคอ้วน อาการร่วมกับไข้ที่พบในระยะแรกของผู้ป่วยเสียชีวิต คือ ปวดท้อง ถ่ายเหลว บางรายได้รับการวินิจฉัยก่อนหรือล่าช้าเกินไปมาก่อน ทั้งนี้ หากผู้ป่วยพบแพทย์ช้าอาจทำให้อาการหนัก และอาจมีโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ หากสงสัยเป็นไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงมากจับพัส ปวดเมื่อย หน้าตาแดง มีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ หรือมีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบพบแพทย์



อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”



สำนักสารนิเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข